

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลอดก่อนกำหนด

การคลอดก่อนกำหนด (Preterm Labor) เป็นภาวะการคลอดก่อนอายุครรภ์ครบ 37 สัปดาห์ซึ่งทางการแพทย์นี้ถึงแม้ว่าอวัยวะต่างๆ ครบสมบูรณ์ แต่การทำงานของอวัยวะแทบทุกส่วนยังไม่ดีเท่าทารกครบกำหนด ซึ่งช่วงหลังคลอดมักต้องการการดูแลเป็นพิเศษ

และต้องอยู่รักษาในโรงพยาบาลนานกว่าปกติ



สัญญาณเตือน

- 1.ปวดหลังช่วงล่างหรือบริเวณเอว เป็นต่อเนื่องหรือเป็นๆ หายๆ แม้มะเป็ล้วยเทาทาง
- 2.เจ็บท้องต่อเนื่องกัน 4 ครั้งใน 20 นาที หรืออาจเกิดเป็นระยะๆ เนื่องจากทารกดิ้นของมดลูก
- 3.มีขูหรือเลือดออกทางช่องคลอด
- 4.รู้สึกมดลูกดิ้นน้อยกว่าปกติ
- 5.บวมและความดันโลหิตสูงขึ้น อาจเป็นสัญญาณของครรภ์เป็นพิษ



คลอดก่อนกำหนด

ปัจจัยเสี่ยง

1. ฆารดา
2. บุตรโศครรภ์ หากบุตรโศครรภ์มีความผิดปกติของโครโมโซมหรือมีภาวะติดเชื้อมัจะทำให้ฆารดามีอาการเจ็บท้องคลอดก่อนกำหนดได้



วิธีการตรวจเช็ค



1. ตรวจภายในโดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของปากมดลูกความกว้าง ระยะห่าง ขนาดตัว และตำแหน่งทารกในครรภ์ เพื่อประเมินความเสี่ยงในการคลอดก่อนกำหนด
2. ตรวจอัลตราซาวด์ เพื่อวัดความยาวและดูรูปร่างของปากมดลูกในการประเมินภาวะครรภ์เสี่ยงและโอกาสคลอดก่อนกำหนด
3. เจาะตรวจน้ำคร่ำ (Amniocentesis) เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของทารกและภาวะติดเชื้อมัต่างๆ

